

Docteur FRANÇOIS
10, Place de la Nation.
75012 PARIS

Paris, le 10 mai 2000.

Jean DANIEL
46 ans, 82 kg.

Continuer le traitement

- **GLUCOPHAGE Retard**
un comprimé au repas du midi et du soir. Traitement de 3 mois.
 - **Prendre en plus, SOLU PRED 20 mg.** 2 comprimés matin, et soir pendant 4 jours.
2 comprimés matin et 1 le soir pendant 2 jours.
1 comprimé matin et soir pendant 1 jour.
1 comprimé le matin pendant 1 jour puis arrêt du traitement.
 - **TOTALEN 500 mg.** Gélules
2 gélules matin et soir - 1/2 heure avant les repas. - 8 jours
 - **Gouttes nasales:**
Ephédrin chlorhydrate 0,25 g. Eucalyptol 0,12 g.
Huile essentielle de Nisouli 0,05 g. Huile q.s.p 30ml
mettre un goutte dans chaque narine 3 ou 4 fois par jour pendant 8 jours.
 - **Gélules selon formule:** extrait sec de passiflor 0,02 g.
extrait sec de Valériane 0,05 g. Diazépam
usq. deux milligrammes. Excipient q.s.p. une gélule n° 60.
Prendre une gélule le matin, à midi, à 16 heures et le soir au coucher pendant 15 jours.
- Dans un mois, refaire un contrôle de GLYCÉMIE



CAP EMPLOYÉ EN PHARMACIE	SESSION 2000
	Code : 50 331 04
ÉPREUVE : DACTYLOGRAPHIE	Durée : 0h30

Docteur FRANCOIS
10 Place de la Nation
75012 PARIS

Paris, le 10 mai 2000

Monsieur DANIEL
46 ans, 82 kg

Continuer le traitement.

GLUCOPHAGE Retard.

Un comprimé au repas du midi et du soir. Traitement de trois mois.

Prendre en plus :

SOLUPRED 20 mg.

Deux comprimés matin et soir pendant quatre jours. Deux comprimés matin et un le soir pendant deux jours. Un comprimé matin et soir pendant un jour. Un comprimé le matin pendant un jour, puis arrêt.

TOTAPEN 500 mg gélules.

Deux gélules matin et soir, à prendre ½ heure avant les repas, pendant huit jours.

Gouttes nasales selon la formule :

Ephédrine chlorhydrate	0,25 g
Eucalyptol	0,12 g
Huile essentielle de Niaouli	0,05 g
Huile q.s.p.	30 ml

Mettre une goutte dans chaque narine trois fois par jour pendant huit jours.

Gélules selon la formule :

Extrait sec de Passiflore	0,02 g
Extrait sec de Valériane	0,05 g
Diazépam	vingt deux milligrammes
Excipient q.s.p. une gélule n° 60.	

Prendre une gélule le matin, à midi, à 16 heures et le soir au coucher pendant quinze jours.

Dans un mois, refaire un contrôle de la glycémie.

Docteur François

Copie conforme établie le
Signature et cachet de la Pharmacie