

**BREVET PROFESSIONNEL
PREPARATEUR EN PHARMACIE**

SESSION 2005

U32 – Commentaire Technique Ecrit

1- Recevabilité de l'ordonnance 1 point

Médecin : Il manque la qualité du médecin.

Patient : Il manque le prénom.

L'ordonnance n'est donc pas recevable

2- Analyse des spécialités 4 points

SEROPRAM 20mg : (1 point)

DCI : citalopram

Comprimés pelliculés sécables à 20 mg,

Liste : I

Classe : antidépresseur, inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine.

Indication : épisodes dépressifs

Posologie : Correcte

Délivrance : 3 boîtes de 28 cp le 1^{er} mois, 2 boîtes le 2^{ème} mois, 2 boîtes le 3^{ème} mois et 2 boîtes le 4^{ème} mois.

VICTAN 2 mg :

DCI : loflazépatate d'éthyle (1 point)

Comprimés pelliculés sécables à 2 mg.

Liste I

Classe : anxiolytique ; famille des benzodiazépines.

Indication : anxiété

Posologie : correcte

Délivrance : 1 boîte de 30 le premier mois à renouveler DEUX fois (et non pas trois) car le traitement est limité à douze semaines (réglementation des anxiolytiques).

SURGAM 200mg : (1 point)

DCI : acide tiaprofénique

Comprimés sécables à 200mg

Liste II

Classe : AINS : famille des propioniques

Indication : anti-inflammatoire et antalgique

Posologie : dépassée.

La posologie normale doit être de 200 mg 3 fois par jour soit 600mg maximum par jour en traitement d'attaque or la prescription est de 400 mg 3 fois par jour soit 1 200 mg par jour.

Il faut avertir le prescripteur qui devra revoir l'ordonnance.

HYPERIUM : (1 point)

DCI : Rilmenidine

Comprimés à 1 mg

Liste I

Classe : antihypertenseur central

Indication : hypertension artérielle

Posologie correcte

Délivrance : avertir le médecin car contre-indication absolue en cas d'état dépressif grave.

3- Analyse du dispositif médical 1,5 point

Genouillère LIGAFLEX G₂

Genouillère ligamentaire à ouverture rotulienne avec renforts latéraux, en tissu élastique.

Mesures à prendre : tour de mollet et tour de cuisse

- Tour de mollet pris à 12 cm au dessous du genou.
- Tour de cuisse pris à 14 cm au dessus du genou.

6 tailles référencées

Remboursement LPPR

Indication : entorses bénignes / entorses compliquées.

4- Analyse globale de la prescription 8 points

Action thérapeutique (3 points)

Sujet masculin, âgé de 55 ans, atteint de dépression nerveuse (SEROPRAM) accompagné d'anxiété (VICTAN) ; le malade souffre d'hypertension artérielle (HYPERIUM) et d'une pathologie inflammatoire (SURGAM + genouillère LIGAFLEX).

Contre indication absolue : HYPERIUM contre indiqué en cas de dépression grave. (4 points)

Si le candidat relève la contre indication et la qualifie d'absolue : les points lui sont attribués.

Si le candidat relève la contre indication et ne la qualifie pas d'absolue : 2 points lui sont attribués.

Si le candidat ne signale pas la contre-indication, il s'agit d'une erreur majeure de commentaire et la note zéro au CTE est attribuée.

Association à prendre en compte : HYPERIUM et VICTAN : altération de la vigilance.

Posologie anormale : (2 points)

SURGAM : surdosage : dose normale : 600 mg par jour
 dose prescrite : 1 200 mg par jour.

⇒ Ne pas délivrer et avertir le prescripteur.

Si le candidat ne relève pas la posologie anormale, il s'agit d'une erreur majeure de commentaire et la note zéro au CTE est attribuée.

5- Formalités de délivrance 1,5 point

Inscription à l'ordonnancier : des produits liste I et II (soit Séropram, Victan, Surgam et Hypérium)

Inscription sur l'ordonnance : - Tampon de l'officine
 - N° d'ordonnancier
 - Quantités délivrées
 - Date de la délivrance

Inscription sur le conditionnement : - Tampon de l'officine
 - N° d'ordonnancier
 - Posologie et mode d'emploi

6- Conseils 4 points (4 x 1 point)

- Eviter l'absorption d'alcool pendant le traitement
- Risque de somnolence donc diminution de la vigilance automobile...
- Prendre les comprimés de SURGAM au milieu des repas pour éviter les risques digestifs
- Privilégier une alimentation pauvre en sel (éviter les aliments en conserve, charcuteries, plats cuisinés...)
- Ne pas arrêter brutalement le traitement même en cas d'amélioration.

Par rapport à la genouillère :

- - mettre le matin au lever, ôter au coucher ;
- laver à la main, eau tiède et sécher à plat.
- Eviter d'appliquer une crème juste avant de mettre la genouillère (présence d'élasthane).