

BP Préparateur en pharmacie Groupement inter académique Grand Est  
 Travaux pratiques de préparation et de conditionnements de médicaments

**FICHE DE PREPARATION (1<sup>ère</sup> préparation magistrale)**

Identification du candidat :

Date de fabrication :      Forme : **Gélule**      Posologie : **1 gélule 2 fois par jour**      Quantité à préparer : **30**

Liste	Formule du prescripteur :		Quantités à mesurer : masse ou volume	① P-ST	② Balance : T-R-E	③ Mesure : CG-E-P	N° de Lot	Visa du surveillant
	Désignation des produits	Quantité						
	Harpagophytum titrex	0,15 g	4,50 g					
	Valériane titrex	0,10 g	3 g					
1	Diazépam	2,4 mg	0,072 g	P 0,72 g				
	Excipient lévillite		qsp volume					

Tare du récipient :      Autocontrôle quantitatif :

Calculs :

2,4 mg = 0,0024 g X 30 = 0,072

Poudre titrée au 10<sup>ème</sup> = 1 g PA → 10 g poudre titrée  
 0,072 PA → x = 0,072 g X 10 = 0,72 g

Justification de l'étiquetage :

Diazépam jamais exonéré  
 Préparation en liste I

Etiquette blanche  
 Nom et adresse de la pharmacie  
 N° d'ordonnancier  
 1 gélule 2 fois par jour  
 Date fabrication

Protocole de fabrication :

Mélanger les poudres dans l'ordre croissant  
 Mesurer à l'éprouvette, déterminer la taille des gélules  
 Compléter avec lévillite au volume désiré  
 Reprendre la poudre au mortier et tamiser (ou non à cause du titrex)  
 Mettre en gélules.

+ contre étiquette rouge "Respecter les doses prescrites"

① Poudre ou Solution titrée      ② Trébuchet, Roberval ou balance Electronique      ③ Compte-Gouttes, Eprouvette ou Pipette

BP Préparateur en pharmacie Groupement inter académique Grand Est  
Travaux pratiques de préparation et de conditionnements de médicaments

Identification du candidat :

**FICHE DE PREPARATION (2<sup>ème</sup> préparation magistrale)**

Date de fabrication :

Forme :

Pommade

Posologie :

Appliquer 2 fois par jour

Quantité à préparer :

50 g

Formule du prescripteur :

Liste	Formule du prescripteur :		Quantités à mesurer : masse ou volume	① P-ST	② Balance : T-R-E	③ Mesure : CG-E-P	N° de Lot	Visa du surveillant
	Désignation des produits	Quantité						
II	Chlorhydrate de procaïne	0,05 g	0,05 g		E			
	Eau distillée	2 g	2 g			CG 40		
	Lanoline	23,50 g	23,50 g		R			
	Vaseline	23,50 g	23,50 g		R			
	Baume du Pérou	0,95 g	0,95 g		E			

Tare du récipient :

Autocontrôle quantitatif :

Calculs :

Lanoline )  
Vaseline ) à 23,50 g = lanoline 23,50 g et vaseline 23,50 g

Justification de l'étiquetage :

Chlorhydrate de procaïne liste II  
Jamais exonéré

Etiquette rouge + contre étiquette rouge RLDP  
Ne pas avaler

Protocole de fabrication :

Dissoudre le chlorhydrate de procaïne dans l'eau distillée  
Incorporer à la moitié de la lanoline  
Incorporer le baume du Pérou dans le reste de la lanoline  
Rassembler les deux mélanges, puis incorporer progressivement la vaseline  
Homogénéiser.

① Poudre ou Solution titrée

② Trébuchet, Roberval ou balance Electronique

③ Compte-Gouttes, Eprouvette ou Pipette

BP Préparateur en pharmacie Groupement inter académique Grand Est

Travaux pratiques de préparation et de conditionnements de médicaments

Identification du candidat :

**FICHE DE PREPARATION (Préparation officinale)**

Date de fabrication :

Forme :

Suppositoire

Posologie :

1 suppositoire le soir

Quantité à préparer :

6

Formule du prescripteur :

Quantités à mesurer :  
masse ou volume

①  
P-ST

②  
Balance :  
T-R-E

③  
Mesure :  
CG-E-P

N° de Lot

Visa du  
surveillant

Liste

Désignation des produits

Quantité

1

Sulfate de quinine

0,25 g

1,65 g

Excipient

qsp

1 suppo N°6

18,97 g

Tare du récipient :

Autocontrôle quantitatif :

Diagnose :

Désignation du produit : Sulfate de quinine

Conclusion :

Justification de l'étiquetage :

Etiquette blanche  
+ contre étiquette "Respecter les doses  
prescrites"

(Sulfate de quinine liste 1 non exonéré)

① Poudre ou Solution titrée

② Trébuchet, Roberval ou balance Electronique

③ Compte-Gouttes, Eprouvette ou Pipette