


TERRAINS SECONDAIRES


Rognacien



C7bL Calcaires lacustres


C7bA Grès et argiles "à Reptiles"

Bégudien



C7a Argiles
1 - Niveau à pisolithes

Crétacé supérieur




C6 - Valdo-Fuvélien :
C6b - Fuvélien : calcaire marneux et marnes
C6a - Valdोनien : marnes et calcaires
C5b-6a "Brèche des Lambès"
C5-6a - Marnes, calcaires, sables
C5 - Santonien : marnes et calcaires à Rudistes
C4-5 - Coniacien-Santonien non différenciés
C4 - Coniacien
C3-4 - Turonien-Coniacien
C2 - Cénomarien
||||| - Niveau de calcaires à Rudistes


Crétacé inférieur



n7 Albien : calcaires à silex
Al - Bauxite



nsb-6a Bédoulien supérieur et Gargasien



n4-saU Barrémien et Bédoulien inférieur : calcaires à faciès urgonien
nz - Valanginien : calcaires et calcaires marneux

j7-n4 - Kimmérigien à Barrémien indifférenciés : dolomies

Jurassique moyen et supérieur (partie sud-ouest)



j9b-n1 - Portlandien-Berriasien supérieur : calcaires blancs
j9bD - Portlandien supérieur : dolomies
j9aD - Portlandien inférieur : dolomies
j7-n - Kimmérigien : calcaires
j7-aD - Kimmérigien : dolomies
j3-6 - Callovo-Oxfordien : calcaires