

FICHE DE PREPARATION

Sujet n° 17

Date de fabrication :
Date de l'examen

Forme pharmaceutique :
Gélules

Posologie :
1 gélule en début de crise de
migraine

Quantité à préparer :
20

Formule réalisée : Désignation des produits

Quantité pour la
préparation
(masses, volumes ou gouttes)

Visa du (des) correcteur(s)
attestant les pesées

Autocontrôle

PA Tartrate d'ergotamine poudre titrée au 1/100^{ème}

2 g

PA Caféine

1 g

PA Acide acétylsalicylique

2 g

EX Excipient

QSP 20 gélules

(Nature de l'excipient obligatoirement précisée par le candidat)

Calculs spécifiques :

Poudre titrée au 1/100^{ème} de tartrate

d'ergotamine :

(0,001 X 100) X 20 = 2 g

Caféine : 0,05 X 20 = 1 g

Acide acétylsalicylique : 0,10 X 20 = 2 g

Protocole de fabrication
(Pour les PO, uniquement si différent de celui proposé) :

Dans un mortier, introduire les poudres en homogénéisant entre chaque ajout.

Mesurer le volume de poudre médicamenteuse dans une éprouvette afin de

déterminer la taille des gélules et le volume de poudre inerte à ajouter.

Homogénéiser. Tamiser et homogénéiser à nouveau.

Diviser en 20 gélules.

N° d'ordonnancier :

Justification de l'étiquetage :

Ergotamine tartrate Liste I

qmp ici 0,02 g > 0,01 g

--> non exonéré, donc :

- Etiquette blanche + mentions obligatoires

- Contre étiquette rouge RLDP

Signature de l'examiné

ME PAS REMPLIR

FICHE DE PREPARATION

Sujet n° 17

Date de fabrication : Date de l'examen	Forme pharmaceutique : Crème	Posologie : Appliquer 2 fois par jour sur l'hématome	Quantité à préparer : 50 g
Formule réalisée : Désignation des produits		Quantité pour la préparation (masses, volumes ou gouttes)	Visa du (des) correcteur(s) attestant les pesées
EX	Huile de vaseline	8 g	Autocontrôle
PA	Teinture d'arnica	75 gouttes	
EX	Alcool cétylique	5 g	
EX	Laurylsulfate de sodium	0,3 g	
EX	Eau purifiée	35,20 g	
Calculs spécifiques : teinture d'arnica : 53 gouttes au gramme $75 : 53 = 1,41 \text{ g}$ Eau purifiée : $50 - (8 + 1,41 + 5 + 0,3) = 35,2 \text{ g}$		Protocole de fabrication (Pour les PO, uniquement si différent de celui proposé) : Préparer la phase L avec huile de vaseline et alcool cétylique. Préparer la phase H avec eau purifiée et laurylsulfate de sodium. Faire chauffer séparément les deux phases au bain-marie à la même température. Réunir les deux phases et homogénéiser jusqu'à refroidissement. Ajouter les gouttes de teinture d'arnica et homogénéiser. Conditionner en pot.	
N° d'ordonnancier :		Justification de l'étiquetage :	
Produits hors liste, donc :		Etiquette blanche + mentions obligatoires	
Signature de l'étudiant : NE PAS REMPLIR			

FICHE DE PREPARATION

Sujet n° 17

Date de fabrication :		Forme pharmaceutique : Pâte zincique à l'eau		Posologie : Appliquer 2 fois par jour		Quantité à préparer : 50 g	
Date de l'examen :		Formule réalisée : Désignation des produits		Quantité pour la préparation (masses, volumes ou gouttes)		Visa du (des) correcteur(s) attestant les pesées	
PA		Carbonate de calcium		12,5 g			Autocontrôle
PA		Oxyde de zinc		12,5 g			
EX		Glycérine		12,5 g			
EX		Eau purifiée		12,5 g			
Calculs spécifiques :		Protocole de fabrication (Pour les PO, uniquement si différent de celui proposé) :				Quantitatif : - Tare : - Masse nette :	
						Qualitatif : - Caractères :	
						N° d'ordonnancier :	
						Justification de l'étiquetage :	
						Produits hors liste, donc :	
						Etiquette blanche + mentions obligatoires	

Signature du préparateur

NE PAS REMPLIR