



SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP de Clermont-Ferrand
pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

1. RECEVABILITE DE L'ORDONNANCE

2 points

Il manque le prénom du malade et la signature du prescripteur.
L'ordonnance n'est pas recevable.

3. ANALYSE DU DISPOSITIF

2 points

Description

CLIF® Ampoules

Pansément à usage unique

Modèle Talon

Carboxyméthylcellulose, polyisobutylène, revêtement en polyuréthane.

Intérêt

Utilisation en prévention des ampoules sur les talons.

Prévention en milieu humide dans les chaussures de marche

Utilisation :

Appliquer sur une peau propre et sèche.

Réchauffer le pansément une minute dans le creux de la main.

Non remboursé

Brevet professionnel				
Spécialité : Préparateur en Pharmacie		Epreuve : U 32 Commentaire technique écrit		
Session 2010	Repère : U 32	Durée 1 h00	Coef. 5	1/4
CORRIGE				

2. ANALYSE DES SPECIALITES

8 points

Nom Dosage DCI	Liste et/ou législation particulière	Classe pharmacologique et/ou thérapeutique précise	Indication thérapeutique succincte (dans le cadre de l'ordonnance)	Utilisation et/ou mode d'emploi
GLUCOPHAGE® Metformine 1000 mg / comp	Liste I	Antidiabétique oral Biguanide	Diabète Type II (ou non insulinodépendant)	A avaler au cours ou à la fin des repas
NOVONORM® Répaglinide 0,5 mg / comp	Liste I	Carbamoylméthyl- benzoïque sécrétagogue	Diabète Type II (ou non insulinodépendant)	A avaler 15 minutes avant les repas
DOLIPRANE® Paracétamol 1000 mg / comp	Hors Liste	Analgésique (Antalgique)	Douleurs légères ou modérées	Comprimés à avaler tels quels avec une boisson Respecter un intervalle de 4 heures au minimum entre deux prises avec un maximum de 4 prises par jour
FUCIDINE® Acide fusidique Pommade à 2 %	Liste I	Antibiotique local Fusidanines	Infection de la peau due à staphylocoques et streptocoques	En application locale après nettoyage de la plaie infectée Eviter de l'appliquer en couche épaisse

Brevet professionnel			
Spécialité :	Préparateur en Pharmacie	Epreuve : U 32 Commentaire technique écrit	
Session 2010	Repère : U 32	Durée 1 h00	Coef. 5
CORRIGE			
			2/4

4. ANALYSE GLOBALE DE LA PRESCRIPTION

- But thérapeutique :

- L'ordonnance est destinée à un adulte atteint de diabète de type II non insulino-dépendant pour lequel le régime alimentaire et l'exercice physique ne sont pas suffisants pour rétablir l'équilibre glycémique
- Il souffre de douleurs.
- Il présente une plaie infectée au talon.
- En prévention d'ampoules, des pansements lui sont délivrés

- Association bénéfique :

Pour agir sur plusieurs composantes de la pathologie (diabète de type II), association de deux antidiabétiques oraux (GLUCOPHAGE® + NOVONORM®) lorsque le GLUCOPHAGE® n'est pas suffisant pour réguler la glycémie, *on associe le NOVONORM®* qui stimule la sécrétion d'insuline et le GLUCOPHAGE® qui réduit la glycémie basale et post-prandiale sans stimuler l'insuline (pas d'hypoglycémie)

- Posologie maximale dépassée du Paracétamol / DOLIPRANE®

Les Doses Maximales Adulte du paracétamol sont de 1g par dose et 4g par 24 heures. La prescription est de 2 comprimés par prise 4 fois par jour, soit 2g par prise et 8g par 24 heures. : La posologie maximale est dépassée par prise 4 fois par jour et par 24 heures.

- Conclusion

Le DOLIPRANE® ne sera pas délivré, consulter le pharmacien. Cette ordonnance comporte une erreur majeure

- Délivrance

GLUCOPHAGE® 1000 1 boîte de 90 cp pour 1 mois AR deux fois
 NOVONORM® 0,5 mg 1 boîte de 270 cp ou 1 boîte de 90 cp pour 1 mois non renouvelable
 DOLIPRANE® 1000 Ne pas délivrer
 FUCIDINE® pommade 1 tube
 CLIP® ampoules 1 boîte
 (A noter à 0/0,5 pour NOVONORM® et 0/0,5 pour GLUCOPHAGE® si le candidat n'a pas délivré les grands modèles, conformément au CSP-Loi 2007).

5. FORMALITES DE DELIVRANCE

1 point

Spécialités nécessitant des formalités de délivrance: GLUCOPHAGE®, NOVONORM®, FUCIDINE®

Mentions à inscrire sur les conditionnements : posologie et mode d'emploi

Brevet professionnel				
Spécialité : Préparateur en Pharmacie		Epreuve : U 32 Commentaire technique écrit		
Session 2010	Repère : U 32	Durée 1 h00	Coef. 5	3/4
CORRIGE				

6. CONSEILS AUX PATIENTS

14 points

➤ Effets indésirables des spécialités

- GLUCOPHAGE® 1000 : troubles gastro-intestinaux (nausées vomissement, diarrhées, plus fréquents en début de traitement), perturbation du goût
- NOVONORM® 0,5 mg : douleurs abdominales et diarrhées
- Risque d'hypoglycémie lors de l'association GLUCOPHAGE®/ NOVONORM®

➤ Signes d'alerte d'hypoglycémie

Sueurs, tremblements, pâleur, tachycardie, vertiges, faim, fatigue, somnolence, troubles de la vue, picotements des lèvres, anxiété, nervosité, trouble du comportement et de la parole

- ...

➤ Conseils diététiques du diabète :

- Alimentation équilibrée : consommer particulièrement des fibres (tend à diminuer le taux de sucre et à retarder l'assimilation des sucres), préférer une cuisson al dente (pour diminuer l'indice glycémique des pâtes)
- Eviter la consommation d'alcool : maximum trois verres par jour
- Avoir toujours sur soi quelques morceaux de sucre
- Prendre ses repas à heures régulières
- Eviter de sauter un repas
- Eviter la consommation de sucres rapides (bonbons, chocolat, ...)
- Equilibrer et répartir les sucres lents sur 24 heures (riz, pâtes,...)

-

➤ Conseils d'hygiène du pied du diabétique :

- Surveiller attentivement les pieds (perte de la sensibilité du pied du patient diabétique)
- Surveiller attentivement la plaie (risque de retard de cicatrisation du patient diabétique)
- Evitez l'utilisation de ciseaux, lames ou tout objet coupant pouvant entraîner une plaie
- Bien sécher entre les orteils pour éviter la macération
- Eviter la présence de corne (cors, durillon ou corne au talon)
- Se couper régulièrement les ongles pour éviter tout risque d'ongle incarné

-

➤ Autres conseils :

- Activité physique adaptée
- Surveillance régulière chez l'ophtalmologiste et/ou le cardiologue conseillée
- Surveillance minimum de une fois par an chez le dentiste
- Randonnées pédestres conseillées avec d'excellentes chaussures de marche
- Conseiller au patient de porter sur lui sa carte de diabétique
- Surveillance de la glycémie qui conditionnera les posologies

-...

Brevet professionnel				
Spécialité : Préparateur en Pharmacie		Epreuve : U 32 Commentaire technique écrit		
Session 2010	Repère : U 32	Durée 1 h00	Coef. 5	4/4
CORRIGE				