



**LE RÉSEAU DE CRÉATION  
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES**

**Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l'académie de Montpellier  
pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.**

**Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.**

<b>DANS CE CADRE</b>	Académie :	Session :
	Examen :	Série :
	Spécialité/option :	Repère de l'épreuve :
	Epreuve/sous épreuve :	
	NOM :	
	(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse) Prénoms :	N° du candidat <input type="text"/>
	Né(e) le :	(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)
<b>NE RIEN ÉCRIRE</b>	Appréciation du correcteur	
	<input type="text"/>	

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

# Mention complémentaire

## AIDE À DOMICILE

**E2 – accompagnement et aide à la personne dans les activités de la vie quotidienne et dans le maintien de l'autonomie**

Durée : 3h00

Coef. : 3

## SUJET n° 23

Mention Complémentaire Aide à Domicile	Session 2016		<b>SUJET n° 23</b>
E2 – Accompagnement et aide à la personne dans les activités de la vie quotidienne et dans le maintien de l'autonomie	Durée : 3h00	Coefficient : 3	Page 1/7

# NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

## Situation :

Madame André, âgée de 79 ans vivait seule dans sa maison depuis le décès de son mari. Elle était autonome malgré une baisse de l'acuité auditive et visuelle (à cause d'un début de cataracte).

L'état de santé (évolution de sa coxarthrose) de madame André s'est aggravé, elle ne peut plus assumer seule les tâches de la vie quotidienne. Elle a donc intégré depuis 3 mois l'EHPAD de sa commune.

Elle a besoin d'une aide pour la toilette et le lever du lit. Madame André peut se déplacer seule et se lever seule du fauteuil en se servant de son déambulateur. Il est 8h30 Mme André vous attend dans son lit.

## Partie pratique (2 heures maximum) : 30 points

Le candidat devra :

- Recueillir les données nécessaires à la situation (Annexe 1),
- Effectuer les tâches dans l'ordre de priorité indiqué au préalable :
  - L'aider à se lever de son lit
  - Effectuer la réfection de son lit
  - L'aider à réaliser sa toilette au lavabo
- Évaluer l'action effectuée (Annexe 2).

## Partie écrite (1 heure maximum – répondre aux questions ci-dessous) : 20 points

## Partie orale : 10 points

### Conditions de réalisation :

- Vous gérez le temps imparti (3 heures maximum),
- Vous avez à votre disposition le matériel et les produits présents dans les locaux,
- Vous justifierez vos activités à l'oral et vous devez être capable de proposer une adaptation de la situation au domicile privé.



## Fiche d'auto-évaluation

Opérations	Effectuées correctement		Justifications	Propositions d'amélioration éventuelles
	oui	non		

**NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE**

# NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

## Sciences médico-sociales (10 points)

1. Identifier deux spécificités de l'habitat urbain.

- .....  
- .....

2. Donner deux signes indiquant une perte d'autonomie chez Madame André.

- .....  
- .....

3. Indiquer les modifications anatomiques et/ou physiologiques liées au vieillissement en ce qui concerne l'appareil locomoteur d'une part et les organes des sens d'autre part. (2 réponses exigées pour chacun)

➤ Appareil locomoteur :

- .....  
- .....

➤ Organes des sens :

- .....  
- .....

4. Madame André présentant une déficience auditive, présenter différentes attitudes de son entourage face à cet handicap.

- .....  
- .....

5. Indiquer deux modifications du sommeil chez la personne âgée.

- .....  
- .....

# NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

## Physiopathologie (10 points)

1. Madame André souffre d'une coxarthrose droite dégénérative.

1.1 Énoncer deux symptômes de la coxarthrose.

- .....

- .....

1.2 Énoncer deux principaux traitements de la coxarthrose.

- .....

- .....

2. Madame André prend un comprimé d'*Hyperium* tous les matins pour son hypertension.

2.1 Définir le mot médicament

- .....

2.2 Lire l'extrait de la notice (Annexe 3)

2.2.1 Citer le mode d'administration

- .....

2.2.2 Citer deux effets secondaires

- .....

2.3 Énoncer le rôle du principe actif d'un médicament

- .....

3. Madame André doit avoir une prise de sang la semaine prochaine pour une recherche de glucose et de cholestérol.

3.1 Citer les deux termes correspondant à ces analyses.

- .....

- .....

3.2 Énoncer les différents types de diabète.

- .....

- .....

## NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

4. Énoncer deux manifestations caractéristiques de la cataracte

- .....
- .....

5. Indiquer un exemple de pathologie nécessitant un régime alimentaire.

- .....

### Annexe 3

#### NOTICE / INFORMATION DE L'UTILISATEUR HYPERIUM<sup>®</sup> 1 mg

comprimé

Rilmenidine

#### COMMENT PRENDRE HYPERIUM 1 mg, comprimé ?

##### Posologie / Mode d'administration / Fréquence d'administration / Durée de traitement

La posologie recommandée est de 1 comprimé par jour en une seule prise le matin.  
En cas de résultats insuffisants après 1 mois de traitement, la posologie peut être portée à 2 comprimés par jour, en 2 prises (1 comprimé matin et soir) au début des repas.

Chez l'insuffisant rénal, si la clairance de la créatinine est supérieure à 15 l/mn, en principe la posologie est la même.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN ;

##### QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, HYPERIUM 1 mg, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Ces effets secondaires sont bénins et transitoires aux doses thérapeutiques.

Les plus fréquemment observés sont les suivants : palpitations, insomnie, somnolence, anxiété, syndrome dépressif, troubles sexuels, maux d'estomac, sécheresse de la bouche, diarrhées, constipations, éruption cutanée, démangeaisons, crampes, extrémités (mains et/ou pieds) froides, œdèmes, fatigue, fatigue à l'effort.

Exceptionnellement des bouffées de chaleur, nausées, chute de la pression artérielle lors du passage en position debout pouvant s'accompagner de vertiges ont été observées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.